小学校 5・6年
47

熊本県知事賞

うんちから考えるカブトムシの好み♡

熊本市立川上小学校　6年　上妻　行希弥

1. 研究の目的

ぼくは、6年間カブトムシを育ててきた。その中で、①カブトムシの大きさにちがいがあること、②そのちがいは、幼虫の時の土の環境が原因であるかもしれないこと、③最強の保護色があること、④マイクロプラスチックはカブトムシにも影響すること、⑤カブトムシ、クワガタムシの足の速さにも差があることを見つけた。

そしても年生では、幼虫のときに出るうんちの色がちがう、ていたり、でる量が毎回ちがう、ていてとても不思議に思った。ぼくたちも毎日うんちをするが、毎回うんちの色や量がちがう。そこで、幼虫のときに出すうんちの色や量が、食べる土のちがいによるものなのか、土の種類が幼虫の大きさに影響するのか調べてみた。また、ぼくたちと同じ様に幼虫も食べる土の好ききらいがあるのかを知りたくて研究を開始した。

2. 研究の方法

実験1　2022年に、産まれたカブトムシの幼虫を1匹ずつ「かんじゅくマット」、または「くぬぎマット」でそれぞれ4匹飼い、原則1週間ごとに幼虫の体重や全長、うんちの数や重さを測定した。

実験2　「実験1」で測定したうんち1個あたりの重さの平均を出し、幼虫の体重と関係があるのかを調べた。

実験3　くぬぎマットで育てた幼虫の方がかんじゅくマットで育てた幼虫よりうんちは多く、体重は重かったので、幼虫にも好ききらいがあるのかを次のⒶⒷⒸⒹの方法で調べた。

Ⓐ　2本のペットボトルの真ん中くらいの部分をカッターで切り取り、残った部分に、くぬぎマットとかんじゅくマットをそれぞれ入れ、幼虫を写真9のように土の上に置く。2つのペットボトルを合わせた。つなぎ目は、ビニールテープでとめて、横にして1晩置いた。翌日、幼虫がどちらのボトルの土を食べて調べた(7回)。

Ⓑ　Ⓐと同じ様にして作ったペットボトルを立てて、調査した。ただし、土の上下は毎日入れかえた(6回)(写真9)。

Ⓒ　ペットボトル1本の下半分にかんじゅくマット、上半分にくぬぎマットを入れ、上に幼虫をのせてちらのほうへ移動するかを調べた。

Ⓓ　Ⓒの調査で、幼虫は下にいく傾向があった。しかし、下半分の土は黒くなっていたので幼虫に触れさらいがあるのではなく、暗い方に行く習性があるのではないかと考えた。そこで、ホームセンターで買ったパイプを25cmずつにカットし、図のように3通りで幼虫がいる場所を調べた(6回)。

実験4　幼虫の食べるマットに、ぼくたちが主食としている食べ物が含まれているのかを3食後を使って調べた。また幼虫のふんしたうんちも調べた。

実験5　カブトムシの成虫も土の好ききらいがあるのかを、4年生のときに作ったカブトムシハウスの右にくぬぎマット、左にかんじゅくマットを入れて調べた。

3. 研究の結果

実験1. 幼虫の身体測定



くぬぎマットで育った幼虫は、1匹は死んでしまったが、全長と体重はグングン大きくなっていった。(図1,2)しかし、かんじゅくマットで育った幼虫は、ほぼ体重は減り、4匹中3匹が死んでしまった。

実験2. うんちの数・重さと体重の関係



くぬぎ2は、13g～5gの約5かけてなんと図10.36個ものうんちをした?

どちらも3月ごろに急にうんちの数が増え、4月ごろに最もおおくなった。また、うんちの数はくぬぎマットで育った幼虫の方がおおかった。









くぬぎマットで育った幼虫のうんち1個あたりの重さは、体重の増加と同じように、4月ごろに増えた。しかし、かんじゅくマットで育った幼虫では、うんち1個あたりの重さは春になるにつれ減り、体重も同じように減った。

追加実験1. 幼虫が死んだ原因解明とうんちの固さの実験





























「うんちの固さを調べるために、ペットボトルに500mLの水を入れた。
②コップに1.5, 2, 3cmの線を付けた。③それぞれの高さから落とした。

表1

	1cm	1.5cm	2cm	3cm
①	○	○	○	○
②	○	○	○	○
③	×	○	○	○
④	×	○	○	○
⑤	×	○	○	○
⑥	×	○	×	○
⑦	×	○	×	○
⑧	×	×	×	○

実験1,2の結果、くぬぎマットで育てた幼虫は、ほとんどが死に、土にはつながった。たうんちがあうまた(写真2)。そのうんちは、とても固くまっ黒だった。一方、死んだ幼虫のおなかは、とても固かった。そこで、死んだ幼虫を調べるとおなかにたくさん固いうんちがつまっていた。次に、かんじゅくマットにあった固いうんちを調べたところ、ふんには動けず、固かった。また、うんちの水分量を調べたところ、うんちには平均60%ほどの、全体の50～60%が水分であった(表2、図10)。

表2.

日時	名前	1cm	1.5cm	2cm	3cm	水分量	水分率
9/1	くぬぎ1	0.133	0.05g	0.05g	0.05g	57.1g	%
	くぬぎ2	0.133	0.05g	0.05g	0.05g	50	%
	くぬぎ3	0.133	0.05g	0.05g	0.05g	61.5%	
	くぬぎ4	0.133	0.05g	0.05g	0.05g	61.5%	
9/8	くぬぎ2	0.133	0.05g	0.05g	0.05g	53.8%	
	くぬぎ3	0.133	0.05g	0.05g	0.05g	61.5%	
	平均	0.133	0.05g	0.05g	0.05g	約57.1%	

図10



追加実験2. うんちを分解せよ!うんちの中身は?



表3

	くぬぎマット	かんじゅくマット
1個目	190個	卵全て孵
2個目	93個	卵全て孵
3個目	135個	卵全て孵

うんちの中身を分解してみると、くぬぎの破片は、約90へ190個だった。だが、かんじゅくの破片はほとんど、目にみえず、測定ができなかった。

実験3. 幼虫にも好ききらいはあるのか



表4　縦おきペットボトル2本バージョンⒶ

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目	移動数
A	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	6
B	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	6
C	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	6
D	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	6

●：引き分け　●：くぬぎ　●：かんじゅく

表4のようにくぬぎマットにいた幼虫の回数は、28回中26回でくぬぎマットの方に多くいた。

実験3. 幼虫にも好ききらいはあるのか

表5　縦おきペットボトル2本バージョンⒷ

		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	移動数
上下の結果	上	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	かんじゅく	5
	下	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	5
左右の結果	A	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	5
	B	くぬぎ	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	5
	C	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	5
	D	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	5

乾かぎで幼虫を飼うと下にいることが多いので、下にいくのかを調べたところ、くぬぎマットが下にあるとき100%幼虫はくぬぎマットにいた。しかし下にかんじゅくマットがある時はA、Bは上のくぬぎマットにC、Dはかんじゅくマットにいた。

実験3. 幼虫にも好ききらいはあるのか

表6　縦おきペットボトル1本バージョンⒸ

		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	移動数
上下の結果	上	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	くぬぎ	5
	下	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	5
左右の結果	A	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	6
	B	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	6
	C	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	6
	D	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	6

幼虫は土の下の方にもぐる習性があるので、2本のペットボトルをつないだそのつなぎめに幼虫を入れたから下にいった。たのではと考え、ペットボトル1本上に幼虫をおいて実験をしたが(写真11)、土の種類に関係なく、ほとんどが下の土の方にいた。

実験3. 幼虫にも好ききらいはあるのか

表7　縦おきパイプ2本バージョンⒹ

		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	移動数
上下の結果	上	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	かんじゅく	くぬぎ	5
	下	かんじゅく	くぬぎ	かんじゅく	くぬぎ	くぬぎ	かんじゅく	5
左右の結果	A	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	かんじゅく	かんじゅく	6
	B	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	くぬぎ	かんじゅく	かんじゅく	6
	C	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	くぬぎ	くぬぎ	6
	D	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	かんじゅく	くぬぎ	くぬぎ	6

実験3－Cでは、ペットボトルを置いた場所が「写真12」のようにブロックで下半分が暗くなるとこうだった。そこで、幼虫は土の好ききらいではなく、自然界では土の中は暗いので暗い場所に移動しただけの可能性もある。そこで外から光が入らないよう、パイプを用意してする。暗な状態を作った(写真13,14)。その結果、上にくぬぎマットがある場合でもくぬぎマットにいることが多く(動き軟)、4匹中3匹がくぬぎマットの方に多くいた。

実験4. 幼虫の食べるマット・うんちにデンプンはあるのか?





くぬぎマットやかんじゅくマットには、ヨウ素デンプン反応はおこらなかった。また、マットをにたらデンプンが水に出てきて反応するのではないかと考えたが反応しなかった。またうんちも反応しなかった。

実験5. カブトムシの成虫はくぬぎマットが好き?

表8

	1日目	2日目	3日目
オス①	●	●	●
オス②	●	●	●
オス③	●	●	●
オス④	●	●	●
メス①	●	●	●
メス②	●	●	●

図11



くぬぎマットには、オス・メス関係なくよくいた。(3日間で合計1匹やには匹がくぬぎマットにいた)また、夏休み最終日に土をひっくり返してみるとくぬぎマットには5個卵があったが、かんじゅくマットには1つも卵がなかった。

うんちそめものにチャレンジ!

[方法]
①うんち10まで水2Lをなべに入れ、30分間にた。
②30分間にた後残さ。うんバンしき、あを入れ、さらに1時間にた。
③軽くしぼって、かわかした。

そめる液をそめ糸もいれないでおいただけて、すいぞーっぷしょっぷのような糸がとてもとてもとても